


FAUNA NATIVA DE CHILE



CACHUDITO

Anairetes Palurus Palurus

Es una de las aves más pequeñas del país. Características son sus plumas negras y largas en la cabeza, dobladas hacia adelante semejante a un "cachito".

Su alimento principal son los insectos, aunque también come semillas.



CARPINTERITO

Picoides lignarius



Por sus colores, y especialmente por la nuca roja en el macho, no hay motivo para confundirlo con ninguna otra especie.

Se alimenta de gusanos, larvas e insectos que recolecta buscando entre las grietas de troncos o taladrando los troncos de árboles podridos con su robusto pico.

.

CHURRETE

Cinclodes patagonicus chilensis

Esta especie es la más abundante de los Churretes.

Un poco más pequeño que el Zorzal, se le puede identificar fácilmente por la gran línea blanca sobre los ojos y la garganta del mismo color que sobresalen del tono pardo grisáceo que predomina en su plumaje.



ZORZAL

Turdus falcklandii

El macho tiene la cabeza oscura y la hembra es más pálida. Muy admirado por su lindo y variado canto.

Vive en prácticamente en toda las regiones.





TENCA

Mimus thenca



La tenca es un ave común en los campos y laderas con arbustos. Se distingue fácilmente por su cuerpo pequeño y redondeado, y su larga cola que de largo es casi la mitad del cuerpo.

Cuando vuela lo hace en sucesivos aleteos y planeos hasta otra rama alta. Su canto es dulce y variado y con facilidad para imitar a otras aves.



TORDO

Curaeus curaeus curaeus

Fácilmente identificable por su color negro brillante, se domestica con cierta facilidad. Muy sociable y se encuentra generalmente en bandadas, a veces muy numerosas.

Se alimenta de frutos, insectos y polen.





MIRLO

Molothrus bonariensis



Su gran característica es que es un ave parasitaria, debido a que no construye nidos, sino que aprovecha los nidos de Diucas, Triles, Chincoles, Loicas y otras aves semejantes para depositar sus huevos, usando a las aves dueñas del nido como incubadoras. Incluso llega a botar uno o más huevos legítimos (a veces todos) para formar un espacio suficiente para los suyos.

CHERCAN

Trochilus aedon chilensis

Es un ave insectívora, aunque a veces come algunos frutos de árboles, especialmente, de boldo.



QUELTEHUE

Vanellus chilensis chilensis



El Queltehue es uno de los habitantes característicos de los campos y terrenos húmedos.

Perfecto centinela de día y de noche, está siempre muy atento a cualquier asomo de peligro, lanzando de inmediato un grito metálico estridente.

Básicamente insectívora, por lo que es muy útil para la agricultura, también se alimenta de semillas.

LOICA


Sturnella loyca

Fácil de identificar por su gran mancha roja en la parte delantera, la loica se encuentra en gran parte del territorio.

Gusta de terrenos bajos y húmedos buscando su alimento tanto en el suelo como en los arbustos, el cual se compone de semillas, frutas y crustáceos.

Canto poco variado pero agradable.





AGUILA

Geranoaetus Melanoleucus

Se distribuye en Chile desde Arica hasta Tierra del fuego y su hábitat son especialmente las zonas bajas de las cordilleras de la zona central.

Se alimenta de presas vivas como roedores, conejos y culebras. Construyen grandes nidos en grietas de riscos, o en la copa de grandes árboles.



BANDURRIA

Theristicus caudatus melanopsis (gmelin)

Habita en zonas pantanosas y orillas de lagos, en roqueríos y campos arados y sembrados. Se distribuye en Chile desde Antofagasta hasta Tierra del fuego. Anidan en grietas, riscos, altos acantilados y árboles, poniendo de 2 a 3 huevos.

CERNICALO


Falco sparverius

En Chile se distribuye desde Atacama hasta Tierra del Fuego, pasando por el Archipiélago de Juan Fernández, y posiblemente en islas San Félix y San Ambrosio.

macho



hembra



Su hábitat son los campos, las praderas y las zonas montañosas. Para anidar elige huecos en árboles, hoyos en murallas o barrancos, en incluso en entretechos de casas de campo.

CHINCOL

Zonotrichia capensis

Su presencia en Chile va desde Arica hasta las Islas guaitecas.

Habita campos, cerros, huertos, jardines y plazas.



Es principalmente insectívoro y anida en cualquier arbusto, árbol o matorral, a 1 ó 2 metros de altura, aunque a veces lo hace en el suelo escondido entre el pasto.

CHUNCHO

Glaucidium nanum


Se encuentra desde Atacama hasta Tierra del Fuego. Vive en Llanuras de la costa y del Valle Central y en la Cordillera en bosques hasta los 2.000 m.s.n.m.



Se alimenta de aves, insectos, mamíferos y reptiles. Es agresivo y feroz y caza animales incluso más grandes que él, matándolos rápidamente con sus pequeñas pero poderosas garras. Es de hábitos más diurnos pero es muy difícil de ver.

CISNE DE CUELLO NEGRO

Cygnus melancoryphus



Está presente desde Coquimbo al Cabo de Hornos.

Vive en algunos lagos y lagunas con abundantes totorales generalmente cerca de la costa.

Se alimenta preferentemente de vegetales, aunque también come insectos acuáticos y huevos de peces.

CONDOR

Vultur gryphus

Se distribuye a lo largo de toda la Cordillera de Los Andes, desde Arica hasta Cabo de Hornos.

Es la más grande de las rapaces y se distingue fácilmente por su gran tamaño, que va entre 100 y 120 cms y una envergadura que sobrepasa los 3 mts, además de su característico collar de plumas blancas.

La hembra a diferencia del macho, es más chica y no posee cresta. Generalmente se alimenta de animales y peces muertos que logra ubicar desde las alturas debido a su agudísima vista. Una característica especial del cóndor es que al no ser un ave cazadora, sus uñas son romas y poco curvadas y el dedo trasero es poco desarrollado.



Copyright 2007 by J.Hey N.Hey

DIUCA

Diuca diuca



Su distribución en Chile va desde Coquimbo hasta Aysén y Magallanes, viviendo tanto en los jardines y plazas de las ciudades, como en los matorrales, quebradas y praderas de los campos.

El nido, hecho de pastos y fibras, puede estar en cualquier arbusto, árbol o mata, pero nunca en el suelo.



PEUCO

Parabuteo unicinctus



En Chile se distribuye desde Tarapacá hasta Aysén y Chiloé, desde la costa hasta la precordillera, preferentemente en campos y lomas abiertas.

El Peuco es quizás una de las más abundantes aves de rapiña que cazan al vuelo. Es agresivo, de vuelo rápido y se alimenta de aves campestres e incluso de palomas y pollos domésticos que encuentra en los alrededores de las granjas o poblados. También caza conejos, ratones, sapos y lagartijas.



TRICAHUE

Cyanoliseus patagonus



Se puede encontrar en Chile entre el sur de Atacama y Valdivia, habitando zonas boscosas al pie de las cordilleras.

Para anidar prefiere cuevas en barrancos, las cuales también usa de dormitorio casi todo el año. Interiormente las cuevas son profundas, generalmente con el túnel en zigzag.

COIPO

Myocastor coypus



Habita entre Coquimbo y Magallanes, en lugares cercanos a ríos, lagunas, esteros y pantanos, donde construye, con vegetales, refugios subterráneos con entradas subacuáticas.

Es el roedor más grande que habita en Chile pudiendo alcanzar el tamaño de un gato doméstico. Es un activo nadador y posee en pies y manos, una membrana natatoria, y la cola la usa de timón.

El coipo es vegetariano y con sus grandes incisivos se alimenta preferentemente de algas y de pastos tiernos y tallos que encuentra cerca de la orilla. Es de vida preferentemente nocturna y durante el día se esconde en su madriguera flotante.

DEGU

Octodon degus

Es un animal de hábito diurnos que construye galerías subterráneas, en las cuales vive, con múltiples entradas protegidas por matorrales de espino, litre o quilo.



Son herbívoros; comen raíces, cortezas, microflora y también semillas de vainas de espino. Se alimentan desde el amanecer hasta el mediodía y después en el crepúsculo, para evitar el calor.

VIZCACHA

Lagidium viscacia

Se encuentra desde Arica hasta Ultima Esperanza.. Habita en farellones cordilleranos y precordilleranos, tanto costeros como andinos. Vive entre los roqueríos, donde encuentra guarida para protegerse de la crudeza del clima.



Se alimenta sólo de vegetales como coirones, musgos y líquenes. Animal muy activo, especializado en saltar entre las piedras donde es común verlos tomando baños de sol.

PUDU

Pudu pudu



Habita en bosques y matorrales muy densos, desde Curicó a Aysén, y también en Chiloé, donde es más abundante.

Su alimentación la constituyen hojas, hierbas y una amplia gama de vegetales de la región en la que se desenvuelve.

CHINGUE

Conepatus chinga

Por lo general vive en terrenos con montículos, árboles, matorrales y especialmente de tierra suelta y zonas de cordillera, altiplano y estepa.



Es un animal de hábitos nocturnos, por lo general solitario y omnívoro (insectos, arañas, pequeños roedores, aves terrestres, sapos y bulbos). Cuando se siente atacado levanta la cola y arroja su fétido líquido.

HUEMUL

Hippocamelus bisulus

Originalmente el huemul habitaba desde la zona central hasta Magallanes, pero en la actualidad sólo es posible encontrar huemules en un reducida área de los Nevados de Chillán y en ciertos sectores cordilleranos de la X Región y en determinadas zonas de Aysén.

Como todos los ciervos, sólo el huemul macho posee cornamenta, la cual se compone de dos pares de astas que se bifurcan en la base. La cornamenta, que es cambiada todos los años, se desprende a comienzos de invierno y en primavera comienza el crecimiento de una nueva.



GUANACO

Lama guanicoe

Habita en el altiplano, desde Tarapacá hasta Antofagasta, y también en algunos refugios de las zonas centro y sur, Aysén y Magallanes. Es pariente de la llama y la alpaca, pero a diferencia de estas esta es una especie salvaje.



El guanaco es un buen nadador capaz de cruzar de una isla a otra en lugares como Tierra de Fuego. También son animales muy veloces, pero a menudo son víctimas de sus predadores debido a su enorme curiosidad.

ZORRO CHILLA

Pseudalopex griseus



Está presente a lo largo de todo Chile. Habita el desierto, matorrales abiertos, estepas y sectores costeros.

Vive en lugares arbustivos de baja estatura y raramente penetra hacia los faldeos de la Cordillera de los Andes. Su alimento incluye liebres, conejos y ratones silvestres.



COLOCOLO

Felis colocola



En Chile se distribuye en las regiones de Tarapacá, desde Coquimbo hasta Concepción y desde Aysén hasta Magallanes.

Ocupa áreas de pastizales, bosques hidrófilos y regiones montañosas.

Se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat.



PUMA

Felis concolor patagonica



Habita en áreas cordilleranas desde Arica a Magallanes.

Caza pequeños y medianos animales. Su poderosa fuerza y su elástico cuerpo le permite ser el cazador con más posibilidades de conseguir su sustento.

Su dieta se basa en venados, ñandúes, guanacos, etc, y algunas aves y peces que pesca en ríos y arroyos de aguas poco profundas. Los vegetales también están incluidos en ella al igual que las lagartijas y los pájaros.